


- ### ALGORITMO
- ✓ Garantisci la sicurezza tua, della vittima e degli astanti.
 - ✓ Controlla se la vittima risponde.
 - ✓ Scuoti delicatamente le spalle della vittima, chiedi ad alta voce: "Va tutto bene?"
 - ✓ Se non risponde.
 - ✓ Chiedi aiuto e fatti portare il DAE
 - ✓ Ruota la vittima sul dorso e apri la bocca, estendendo la testa e sollevando il mento.
 - ✓ Mantieni le vie aeree aperte, posiziona la cannula OF, guarda, ascolta e senti se la vittima respira e controlla i segni di circolo.
 - ✓ Se non sono presenti segni di circolo.
 - ✓ Posiziona le piastre e accendi il DAE.
 - ✓ Se ACC testimoniato
 - ✓ Premi il tasto > sul DAE [Lifepak 500]
 - ✓ Contatta o fai contattare la COEU e comunica l'analisi DAE
 - ✓ Attendi le comunicazioni COEU
 - ✓ Segui le indicazioni vocali del DAE
 - ✓ Se ACC NON testimoniato
 - ✓ Esegui 2 minuti di RCP 30:2
 - ✓ Contatta o fai contattare la COEU e comunica l'analisi DAE
 - ✓ Contatta o fai contattare la COEU e comunica l'analisi DAE
 - ✓ Segui le indicazioni vocali del DAE
 - ✓ Quando richiesto esegui la RCP
 - ✓ Inizia le compressioni toraciche (30 compressioni)
 - ✓ Posiziona l'eminenza palmare di una mano al centro del torace.
 - ✓ Posiziona l'eminenza palmare dell'altra mano sopra la prima mano
 - ✓ Incrocia le dita delle mani e inizia le compressioni
 - ✓ Combina le compressioni toraciche con le ventilazioni (2 ventilazioni), utilizzando il pallone autoespandibile, la cannula orofaringea (OF) e l'ossigeno a 12 l/min.



- ### MSA IN ARRIVO
- ✓ **Algoritmo shock consigliato (rosso):**
 - ✓ Continua ad applicare l'algoritmo fino all'arrivo del MSA, seguendo le indicazioni DAE.
 - Se il DAE comunica shock non consigliato passa all'algoritmo corrispondente (verde).
 - ✓ **Algoritmo shock non consigliato (verde):**
 - ✓ Continua ad applicare l'algoritmo fino all'arrivo del MSA, seguendo le indicazioni DAE.
 - Se il DAE comunica shock consigliato passa all'algoritmo corrispondente (rosso).

- ### MSA NON IN ARRIVO
- ✓ **Algoritmo shock consigliato (rosso):**
 - ✓ Completa 3 analisi ed esegui il trasporto.
 - Se il DAE comunica in qualunque momento shock non consigliato, continua fino a completare 3 analisi
 - ✓ Dopo la terza analisi defibrilla se consigliato, poi spegni il DAE ed esegui il trasporto.
 - ✓ **Algoritmo shock non consigliato (verde):**
 - ✓ Completa 3 cicli ed esegui il trasporto.
 - Se il DAE comunica shock consigliato passa all'algoritmo corrispondente (rosso).
 - ✓ Dopo la terza analisi spegni il DAE poi continua RCP ed esegui il trasporto.